

Modo de Utilização de FytoSave

1 - Vinha em Agricultura Biológica

Antes da floração: 4 pulverizações (2L/ha), as duas primeiras com um intervalo de 8 dias e as duas seguintes com um intervalo de 10 dias (ou também 8 dias em caso de condições para forte ataque do oídio ou do míldio); pode ser em mistura com doses reduzidas de fungicidas à base de enxofre ou cobre quando coincidindo com os momentos de aplicação destes.

Durante a floração: não aplicação de FytoSave e aplicar fungicidas à base de enxofre ou cobre nas doses habituais.

Depois da floração e até à vindima: igual a antes da floração.

Molhar bem os cachos e folhas, incluindo a página inferior.

2 - Vinha em Protecção Integrada (pode-se obviamente seguir as indicações para AB)

Até ao final da floração: não aplicação de FytoSave, efectuando os tratamentos habituais.

Depois da floração e até à vindima: 4 pulverizações (2L/ha), as duas primeiras com um intervalo de 8 dias e as duas seguintes com um intervalo de 10 dias (ou também 8 dias em caso de condições para forte ataque do oídio ou do míldio); pode ser em mistura com doses reduzidas de fungicidas à base de enxofre ou cobre quando coincidindo com os momentos de aplicação destes.

Molhar bem os cachos e folhas, incluindo a página inferior.

3 - Cucurbitáceas e solanáceas em estufa em AB e PI

5 pulverizações (2L/ha) no máximo, podendo ser desde as 3 folhas verdadeiras até à maturação dos frutos, embora com um intervalo máximo de 7 dias entre aplicações. Manter os restantes tratamentos habituais, nomeadamente sempre que sejam visíveis sintomas de oídio nas plantas.