

INDICAÇÕES RELATIVAS À SUA UTILIZAÇÃO

CARACTERÍSTICAS BIOLÓGICAS

FytoSave® é um estimulador dos mecanismos de defesa das plantas, com acção preventiva, devendo ser aplicado antes do aparecimento dos sintomas da doença.

UTILIZAÇÕES, DOSES/ CONCENTRAÇÕES, ÉPOCAS E CONDIÇÕES DE APLICAÇÃO

Cultura	Doença	Concentração	Época e condições de aplicação	I.S.
Tomateiro, Pimenteiro e Beringela, em estufa	Oídio (<i>L. taurica</i>)	0,2 - 0,8 L/hL (máximo de 2 L/ha)	3 folhas já abertas no caule principal - maturação total: os frutos já atingiram a sua cor típica de plena maturidade (BBCH 13-89)	-
Courgette, Pepino, Melão e Melancia, em estufa	Oídio (<i>S. fuligena</i>)	0,2 - 0,8 L/hL (máximo de 2 L/ha)	3 folhas já abertas no caule principal - o 3º fruto já atingiu o tamanho e a forma característicos (BBCH 13-73)	-
Videira	Oídio (<i>E. necator</i>) Mildio (<i>P. viticola</i>)	0,2 - 0,8 L/hL (máximo de 2 L/ha)	1ª aplicação antes do aparecimento da doença, a partir de 3 folhas já abertas (BBCH 13)	3 dias

CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO E RESTRIÇÕES

Tomateiro, Pimenteiro, Beringela, Courgette, Pepino, Melão e Melancia, em Estufa:

Realizar os tratamentos de modo preventivo, num programa de protecção contra o oídio. Iniciar as aplicações logo que as plantas apresentem 3 folhas e repetir com intervalos de 7 dias, sempre que as previsões das condições meteorológicas sejam favoráveis ao desenvolvimento da doença. Aplicação: pulverização.

Videira:

Realizar os tratamentos de modo preventivo, num programa de protecção contra o oídio e o mildio. Iniciar as aplicações antes do aparecimento da doença, a partir de 3 folhas já abertas e repetir com intervalos de 8 dias, sempre que as previsões das condições meteorológicas sejam favoráveis ao desenvolvimento da doença. Aplicação: pulverização.

PRECAUÇÕES BIOLÓGICAS

Tomateiro, Pimenteiro, Beringela, Courgette, Pepino, Melão e Melancia:

O número máximo de tratamentos a efetuar deverá ser de 5 posicionados até à maturação dos frutos. Os restantes tratamentos devem ser realizados com produtos fitofarmacêuticos de diferente modo de acção. Alternar o uso com fungicidas sempre que sejam visíveis sintomas de oídio nas plantas.

Videira:

O número máximo de tratamentos a efetuar deverá ser de 8 posicionados até ao final da maturação dos frutos. Os restantes tratamentos devem ser realizados com produtos fitofarmacêuticos de diferente modo de acção. Alternar o uso com fungicidas sempre que sejam visíveis sintomas de oídio e mildio nas plantas

MODO DE PREPARAÇÃO DA CALDA

No recipiente onde se prepara a calda deitar metade da água necessária. Juntar a quantidade de produto a utilizar e completar o volume de água, agitando sempre.



Estimulador dos mecanismos de defesa das plantas

1 L Solução concentrada (SL) com 12,5 g/L de COS-OGA

Autorização de Venda nº 1013 concedida pela DGAV
Número de lote e data de produção: ver embalagem

ESTE PRODUTO DESTINA-SE AO USO PROFISSIONAL

PARA EVITAR RISCOS PARA A SAÚDE HUMANA E PARA O AMBIENTE, RESPEITAR AS INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

MANTER FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS

ESTE PRODUTO PODE SER USADO EM MODO DE PRODUÇÃO BIOLÓGICO



MODO DE APLICAÇÃO

Calibrar correctamente o equipamento, assegurando a uniformidade na distribuição de calda no alvo biológico pretendido.

Calcular o volume de calda gasto por ha em função do débito do pulverizador (L/min), da velocidade e largura de trabalho (distância entrelinhas).

Nas fases iniciais de desenvolvimento das culturas aplicar a calda com a concentração indicada. Em pleno desenvolvimento vegetativo, adicionar a quantidade de produto proporcionalmente ao volume de água distribuído por ha, pelo pulverizador, de forma a respeitar a dose.

Volume de calda:

- 250 – 1000 L/ha (Tomateiro, Pimenteiro, Beringela, Courgette, Pepino, Melão e Melancia)
- 400 – 1000 L/ha (Videira)

PRECAUÇÕES TOXICOLÓGICAS, ECOTOXICOLÓGICAS E AMBIENTAIS

- Ficha de segurança fornecida a pedido.
- Evitar respirar a nuvem de pulverização.
- Não pode entrar em contacto com os olhos, a pele ou a roupa.
- Não comer, beber ou fumar durante a utilização deste produto.
- Eliminar o conteúdo e a embalagem em local adequado à recolha de resíduos perigosos.
- Não contaminar a água com este produto ou com a sua embalagem. Não limpar o equipamento de aplicação perto de águas de superfície. Evitar contaminações pelos sistemas de evacuação de águas das explorações agrícolas e estradas.
- Para protecção dos organismos aquáticos, respeitar uma zona não-pulverizada de 5 m em relação às águas de superfície, no caso de utilização na "videira".
- Impedir o acesso de trabalhadores e pessoas estranhas às zonas tratadas até à secagem do pulverizado.

Manter em local seco, ventilado e protegido dos raios solares.

Em caso de intoxicação contactar o Centro de Informação Antivenenos (CIAV), telef.: 800 250 250.

Primeiros Socorros

Recomendação geral: Se for necessário consultar um médico, mostre-lhe a embalagem ou o rótulo.

Em caso de ingestão: Enxaguar a boca; contacte o Centro de Informação Antivenenos ou um médico.

Em caso de inalação: Retirar a pessoa para uma zona ao ar livre e em repouso numa posição que não dificulte a respiração; caso sinta indisposição, contacte o CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS ou um médico.

Em caso de contacto com a pele: Despir/retirar imediatamente toda a roupa contaminada; enxaguar a pele com água abundante. Em caso de irritação cutânea: consulte um médico. Lavar a roupa contaminada antes de a voltar a usar.

Em caso de contacto com os olhos: Enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continuar a enxaguar. Caso a irritação ocular persista: consulte um médico.

Autoproteção do socorrista: Não é necessário equipamento de protecção individual específico para os técnicos de primeiros socorros.

A embalagem vazia deverá ser lavada três vezes, fechada, inutilizada e colocada em sacos de recolha, devendo estes serem entregues num ponto de retoma autorizado; as águas de lavagem deverão ser usadas na preparação da calda.

NOTA

Os resultados da aplicação deste produto são susceptíveis de variar pela acção de factores que estão fora do nosso domínio, pelo que apenas nos responsabilizamos pelas características previstas na Lei. *Marca registada.

Distribuidor em Portugal:
Biosani, Lda.
Quinta de São Brás
Serra do Louro
2950-354 Palmela
Tel: 212 333 019
info@biosani.com
www.biosani.com

Titular da autorização de venda:
FYTOFEND S.A.
Rue Phocas Lejeune, 25,
B-5032 Isnes,
Bélgica
Tel: 0032 (0) 81.728.840
www.fytofend.com

